

**49th INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD**  
**MADRID (SPAIN), JULY 10-22, 2008**

*Chorshanba, 16 iyul, 2008*

**1-masala.** Ot'kir burchakli  $ABC$  uchburchakning balandliklari kesishishi nuqtasi  $H$  bo'lsin. Markazi  $BC$  tomonning o'rtasida bo'lgan va  $H$  nuqtadan o'tadigan aylana  $BC$  to'g'ri chiziqni  $A_1$  va  $A_2$  nuqtalarda kesadi. Huddi shunday, markazi  $CA$  tomonning o'rtasida bo'lgan va  $H$  nuqtadan o'tadigan aylana  $CA$  to'g'ri chiziqni  $B_1$  va  $B_2$  nuqtalarda kesadi, hamda markazi  $AB$  tomonning o'rtasida bo'lgan va  $H$  nuqtadan o'tadigan aylana  $AB$  to'g'ri chiziqni  $C_1$  va  $C_2$  nuqtalarda kesadi.  $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$  nuqtalar bir aylanada yotishini isbotlang.

**2-masala.** (a) Har biri 1 dan farqli bo'lgan va  $xyz = 1$  shartni qanoatlantiruvchi haqiqiy  $x, y, z$  sonlar uchun

$$\frac{x^2}{(x-1)^2} + \frac{y^2}{(y-1)^2} + \frac{z^2}{(z-1)^2} \geq 1$$

tengsizlikni isbotlang.

(b) Yuqoridagi tengsizlik har biri 1 dan farqli bo'lgan va  $xyz = 1$  shartni qanoatlantiruvchi ratsional  $x, y, z$  sonlarning cheksiz ko'p uchliklari uchun tenglikka aylanishini isbotlang.

**3-masala.** Shunday natural  $n$  sonlarining cheksiz ko'pligini isbotlang-ki,  $n^2 + 1$  sonining  $2n + \sqrt{2n}$  sonidan katta bo'lgan tub bo'luvchisi mavjud.

**49th INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD**  
**MADRID (SPAIN), JULY 10-22, 2008**

Payshanba, 17 iyul, 2008

**4-masala.**  $wx = yz$  shartni qanoatlantiruvchi barcha musbat haqiqiy  $w, x, y, z$  sonlar uchun

$$\frac{(f(w))^2 + (f(x))^2}{f(y^2) + f(z^2)} = \frac{w^2 + x^2}{y^2 + z^2}$$

tenglikni qanoatlantiruvchi barcha  $f : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$  funksiyalar (ya'ni, barcha musbat sonlar to'plamida aniqlangan va musbat qiymatlarni qabul qiluvchi funksiyalar) topilsin.

**5-masala.** Natural  $n$  va  $k$  sonlar berilgan bo'lsin, bunda  $k \geq n$  va  $k - n$  ayirma juft son.  $1, 2, \dots, 2n$  sonlar yordamida raqamlangan  $(2n)$ -ta lampalardan har biri quyidagi ikkita holatda bo'lishi mumkin: *on* (yonayapti) yoki *off* (yonmayapti). Eng boshida barcha lampalar yonmayapti. Quyidagi *qadamlar* ketma-ketliklari qaralmoqda: har bir qadamda aynan bitta lampaning holati qarama-qarshi holatga o'zgaradi (yani *on* *off* ga, yoki *off* *on* ga).

$N$  orqali "1 -chi lampadan boshlab  $n$  -chi lampagacha barcha lampalar yonayapti,  $(n + 1)$  - chi lampadan boshlab  $(2n)$  -chi lampagacha esa barcha lampalar yonmayapti" umumiy holatga olib keladigan  $k$  ta qadamdan iborat bo'lgan ketma-ketliklar sonini belgilaymiz.

$M$  orqali "1 -chi lampadan boshlab  $n$  -chi lampagacha barcha lampalar yonayapti,  $(n + 1)$  - nchi lampadan boshlab  $(2n)$  -nchi lampagacha hech qaysi lampa o'zining holatini o'zgartirmagan" umumiy holatga olib keladigan  $k$  ta qadamdan iborat bo'lgan ketma-ketliklar sonini belgilaymiz.

$N/M$  nisbatning qiymatini toping.

**6-masala.** Qavariq  $ABCD$  to'rtburchakda  $|BA| \neq |BC|$ .  $ABC$  va  $ADC$  uchburchaklarga ichki chizilgan aylanalarni mos ravishda  $\omega_1$  va  $\omega_2$  deb belgilaymiz.  $\omega$  aylana  $BA$  kesmaning  $A$  dan boshlab davomiga urinadi,  $BC$  kesmaning  $C$  dan boshlab davomiga urinadi, hamda  $AD$  va  $CD$  to'g'ri chiziqlarga urinadi.  $\omega_1$  va  $\omega_2$  aylanalarning umumiy tashqi urinmalari  $\omega$  aylanada kesishishini isbotlang .